

Il monitoraggio della concentrazione di CO in aria nelle grotte

Original

Il monitoraggio della concentrazione di CO in aria nelle grotte / Balestra, Valentina; DE REGIBUS, Claudio; Fiorucci, Adriano; Vigna, Bartolomeo. - ELETTRONICO. - 42:(2023), pp. 427-428. (Intervento presentato al convegno XXIII Congresso Nazionale di Speleologia "La melodia delle Grotte" tenutosi a Ormea (IT) nel 2-5 June 2022).

Availability:

This version is available at: 11583/2980967 since: 2023-09-28T14:17:53Z

Publisher:

SSI

Published

DOI:

Terms of use:

This article is made available under terms and conditions as specified in the corresponding bibliographic description in the repository

Publisher copyright

(Article begins on next page)

Il monitoraggio della concentrazione di CO₂ in grotte

Original
 Il monitoraggio della concentrazione di CO₂ in grotte in ambiente sotterraneo: un caso di studio in una grotta di Valsusa, Calabria; De Rosa, Claudio; Fiorucci, Adriano; Vigna, Bartolomeo. *ELETTRONICO - 42* (2023), pp. 427-428. (Intervento presentato al convegno XXIII Congresso Nazionale di Speleologia "La melodia delle Grotte" tenutosi a Ormea (IT) nel 2-5 June 2022).

Availability:
 This version is available at: 11583/2980967 since: 2023-09-28T14:17:53Z

Publisher:
 SSI

Published DOI:

Terms of use:
KEYWORDS: caves; CO₂; natural and human impact; monitoring
PAROLE CHIAVE: grotte; CO₂; impatto antropico e naturale; monitoring

This article is made available under terms and conditions as specified in the corresponding bibliographic description in the repository

Publisher copyright

Bartolomeo Vigna (s)
 Valentina Balestra (s), Claudio De Reditus (s), Adriano Fiorucci (s)

IN GROTTE NELLE GROTTE
 (Article begins on next page)
Il monitoraggio della concentrazione di CO₂

ben documentato dai dati rilevati durante questo studio. Infine, altre componenti possono influenzare i valori di CO₂ nelle cavità, come eventi d'infiltrazione d'acqua rilevanti, la presenza di acque sotterranee o una forte attività batterica legata a sostanza organica in decomposizione.

Nella grotta di Bossea, durante il periodo di chiusura, sono state registrate variazioni naturali di CO₂ che oscillano tra i 750 e i 1000 ppm nel periodo invernale e primaverile. In tale periodo sono state eseguite misure di concentrazione di CO₂ libera nell'acqua del collettore della grotta che hanno mostrato valori che diminuiscono lungo il percorso, dalla parte più interna verso l'esterno, evidenziando quindi un rilascio di CO₂ nell'ambiente di circa 14 mg/l a fine settembre. Nel periodo estivo, viene registrato un ulteriore incremento, in parte naturale e in parte legato all'impatto antropico. L'incremento antropico avviene durante i week end e nelle festività ed ha valori di circa 50 ppm in settimana, mentre nei week end raddoppia.

La grotta di Borgio Verezzi è caratterizzata dalla presenza di una serie di laghi che possono influenzare i valori naturali della concentrazione di CO₂. Durante il periodo di chiusura invernale e primaverile a causa delle restrizioni da COVID-19, sono stati misurati valori di CO₂ tra i 500 e i 650 ppm. Nella stagione estiva, i dati evidenziano un notevole incremento di CO₂ che raggiunge i valori massimi nel mese di agosto di circa 3240 ppm. Dalla riapertura della grotta, sono evidenti marcati decrementi di CO₂ (circa 1000 ppm in settimana e anche 2000 ppm nei week end) nelle ore giornaliere, mentre nelle ore notturne i valori rimangono più alti e costanti. Tali decrementi sembrano essere legati all'apertura della porta principale, con conseguente notevole ricambio d'aria e abbattimento della

concentrazione di CO₂.

Le grotte di Toirano sono formate da due grotte, la grotta della Bàsura e la grotta di S. Lucia inferiore, unite successivamente da un condotto artificiale. Nella grotta di S. Lucia inf., nella zona più profonda della cavità, è stato registrato, nella parte bassa di un tratto non turistico, un notevole incremento naturale della concentrazione di CO₂ che raggiunge un picco massimo di circa 7045 ppm alla fine di giugno, e che supera di oltre 5000 ppm la concentrazione di CO₂ rilevato nella parte alta della galleria. Nella grotta della Bàsura invece, la concentrazione di CO₂ ha un probabile incremento naturale estivo più graduale con un picco di 3272 ppm a metà luglio. Dalla riapertura delle grotte, si possono osservare molto bene variazioni giornaliere di CO₂ legate al flusso turistico che superano anche i 1000 ppm. Nel periodo invernale è stato possibile osservare un notevole incremento della concentrazione di CO₂ durante le festività natalizie, tornato ai valori precedenti nell'arco di qualche giorno.

Maggiori approfondimenti ed ulteriori monitoraggi verranno sicuramente sviluppati nei prossimi anni.

Riferimenti bibliografici

- Ek C., Gewalt M. (1985), "Carbon dioxide in cave atmospheres. New results in Belgium and comparison with some other countries", *Earth Surface Processes and Landforms*, 10 (2): 173-187
- Fernández P., Gutierrez I., Quindós L., Soto J., Villar E. (1986), "Natural ventilation of the paintings room in the Altamira cave", *Nature*, 321 (6070): 586-588
- Pla C., Galiana-Merino J.J., Cuezva S., Fernández-Cortès A., Cañaveras J.C., Benavente D. (2016), "Assessment of CO₂ dynamics in subsurface atmospheres using the wavelet approach: from cavity-atmosphere exchange to anthropogenic impacts in Rull cave (Vall d' Ebo, Spain)", *Environmental Earth Sciences*, 75 (5): 1-16